



Figure 1. National Drug Overdose Deaths Number Among All Ages, by Gender, 1999-2017



Source: : Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999-2017 on CDC WONDER Online Database, released December, 2018

図 1.全国薬物過剰摂取による死亡 - 男女別の 1999～2017 年の全年齢の中での数。
2017 年には、違法薬物や処方オピオイドを含む 70,200 人以上のアメリカ人が薬物の過剰摂取で死亡し、これは 10 年間で 2 倍に増加しました。上の図は、1999 年から 2017 年までの全薬物に関連する米国の過剰摂取による死亡の総数を示す棒グラフです。薬物の過剰摂取による死亡は、1999 年の 16,849 から 2017 年には 70,237 まで増加しました。 1999 年から 2017 年までの性別（出典：CDC WONDER）

Figure 8. National Drug Overdose Deaths Involving Benzodiazepines, by Opioid Involvement, Number Among All Ages, 1999-2017



Source: : Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999-2017 on CDC WONDER Online Database, released December, 2018

図 8.オピオイドの関与によるベンゾジアゼピンを含む全国薬物の過剰摂取による死亡 - 1999 - 2017 年の全年齢の中での数。上の図は、1999 年から 2017 年までのベンゾジアゼピンに関連する米国の過剰摂取による死亡の総数を示す棒グラフです。
ベンゾジアゼピンに関連する薬物の過剰摂取による死亡は、1999 年の 1,135 から 2017 年には 11,537 まで増加しました。ベンゾジアゼピンとオピオイド、ベンゾジアゼピンとオピオイドの併用、ベンゾジアゼピンと他の合成麻薬。ベンゾジアゼピンを他の合成麻薬と組み合わせて使用した場合の死亡者数は 2014 年以來着実に増加していますが、ベンゾジアゼピンを含まないオピオイドを使用した死亡者数は安定しています（出典：CDC WONDER）。