




## 亀田メディカルセンター 疼痛・緩和ケア科 「緩和ケア革命宣言」

メニュー 

ホーム >

FDAよりオピオイドとベンゾジアゼピン系薬剤の併用注意喚起が発表されました

### FDAよりオピオイドとベンゾジアゼピン系薬剤の併用注意喚起が発表されました

投稿日: 2016年9月 2日 緩和ケアtips

2016年8月31日付で米国FDA（食品医薬品局）より、「オピオイドとベンゾジアゼピン系薬剤または中枢神経抑制薬の併用に関する注意喚起」が発表されました。

[FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious risks and death when combining opioid pain or cough medicines with benzodiazepines; requires its strongest warning.](#)

同文書では、

- 医療関係者に対して  
オピオイドとベンゾジアゼピンまたは他の種類の中枢神経抑制薬の併用は、他に適切な手段がない場合に限ること
- 患者・家族に対して  
オピオイドとベンゾジアゼピンまたは他の種類の中枢神経抑制薬やアルコールを併用した後に異常なめまいやふらつき、強い眠気、呼吸抑制や呼吸困難感、呼びかけに応えないなどの症状が現れた場合には速やかに受診すること

を呼びかけています。詳しくは[リンク先](#)をご覧ください。

(川名・江川)

## このサイトの監修者



亀田総合病院

疼痛・緩和ケア科部長 関根 龍一

【専門分野】

病状の進行した（末期に限らない）癌や癌以外のあらゆる疾患による難しい痛みのコントロール、それ以外の症状の緩和

« 前の記事 次の記事 »

検索...



## Category

お知らせ・活動報告

カンファレンス

緩和ケアtips

関根の眼

緩和ケアコラム

もしバナのすすめ